

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

20.12.2023 № 15-2/И/2-24036

На _____
№ _____ от _____

Руководителям исполнительных
органов власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения направляет рекомендации по «подчищающей» вакцинации против кори детей разного возраста с применением моно и поликомпонентных вакцин, для использования в работе.

Просим в срок не позднее 25 декабря 2023 г. представить информацию о количестве детей, подлежащих «подчищающей» вакцинации против кори, краснухи и эпидемического паротита.

Одновременно с этим сообщаем, что поставка вакцин планируется с 22 декабря 2023 года поэтапно до конца апреля-мая 2024 года. В связи с чем просим обеспечить организацию прививочной кампании в максимально короткие сроки: разработать «дорожные карты», включая формирование списков детей, подлежащих вакцинации, и графики вакцинации по подведомственным медицинским организациям, в том числе в праздничные дни. Следует также организовать информационную кампанию в регионе по мотивированию населения к вакцинации.

Отчет по охвату вакцинацией просим предоставлять в Минздрав России начиная с 11 января 2024 года, далее еженедельно, по четвергам, в том числе по адресу электронной почты KusurbaevaII@minzdrav.gov.ru.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по коревой инфекции на территории Российской Федерации и устойчивого коллективного иммунитета к кори необходимо обеспечить достижение и поддержание высокого охвата и уровня привитости как детского, так и взрослого населения, а также грамотное проведение мероприятий по подчищающей иммунизации.

Вакцинация против кори, эпидемического паротита и краснухи проводится согласно Приказу Минздрава России от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:

- против кори двукратно в возрасте 1 года и 6 лет;
- против эпидемического паротита двукратно в возрасте 1 года и 6 лет;
- против краснухи двукратно в возрасте 1 года и 6 лет.



Таким образом, плановую двухкратную вакцинацию против кори, паротита и краснухи следует проводить одновременно (в один день), соответственно в возрасте 1 года и 6 лет. Для вакцинации могут быть использованы любые вакцины, содержащие противокоревой компонент, - как моновакцина (живая коревая), так и дивакцина (живая паротитно-коревая), и комбинированная вакцина «Вактривир». При вакцинации детей, особенно раннего возраста, следует отдавать предпочтение комбинированной вакцине. В ситуации преимущественного поступления комбинированной вакцины для плановой вакцинации и ревакцинации рекомендовано использовать её. В свою очередь, использование двухвалентной или моновалентных вакцин следует предусмотреть для подчищающей иммунизации частично привитых и вакцинации переболевших корью или эпидемическим паротитом.

Для проведения подчищающей вакцинации против кори следует руководствоваться следующими рекомендациями:

1. Дети в возрасте от 1 года до 5 лет 11 мес 29 дней, непривитые против кори/или не имеющие документального подтверждения – должны получить одну дозу противокоревой вакцины.
2. Дети в возрасте от 6 лет до 17 лет 11 мес 29 дней, непривитые против кори/или не имеющие документального подтверждения – должны быть привиты противокоревой вакциной двукратно с интервалом 3 месяца.
3. Дети в возрасте 6 лет до 17 лет 11 мес 29 дней, вакцинированные однократно против кори, - должны получить вторую дозу вакцины против кори с минимальным интервалом 3 месяца после первого введения.
4. Взрослые от 18 до 35 лет (включительно) при отсутствии данных о выполненной ранее вакцинации/или перенесенной кори/или вакцинированные однократно/ или отсутствии подтверждения напряженного иммунитета к коревой инфекции* – должны вакцинироваться однократно противокоревой вакциной.
5. Взрослые от 36 лет до 55 лет (включительно), относящиеся к группам профессионального риска (медицинские работники и работники образовательных организаций, сотрудники, занятые в торговле, транспортном обслуживании, коммунальной и социальной сферы; работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов пункта пропуска через границу РФ)*, а также трудовые мигранты, беженцы, лица без определенного места жительства при отсутствии данных о выполненной ранее вакцинации/или перенесенной кори/ или вакцинированные однократно/ или отсутствии подтверждения напряженного иммунитета к коревой инфекции – должны вакцинироваться однократно противокоревой вакциной**.
6. Дети и взрослые, имеющие абсолютные противопоказания к вакцинации живыми вакцинами (первичный иммунодефицит, злокачественные новообразования, беременность) не прививаются противокоревой вакциной. В случае контакта, таким пациентам вводится иммуноглобулин человека нормальный в соответствии с Инструкцией по применению.



* - в рамках обеспечения национального календаря профилактических прививок средствами федерального бюджета

** - взрослые от 18 лет и старше, не относящиеся к вышеобозначенным категориям, без медицинских противопоказаний к вакцинации, не привитые, не болевшие корью, привитые однократно, прививаются за счет собственных средств или средств работодателя.

Все дозы коревой вакцины, введенные в рамках проведения подчищающей иммунизации, должны быть засчитаны и как плановые вакцинации для формирования дальнейшего графика прививок.

В случае проведенной первой вакцинации с использованием только противокоревой вакцины в качестве приоритетной в условиях эпидемиологического неблагополучия по коревой инфекции, в дальнейшем необходимую вакцинацию против краснухи и эпидемического паротита, в соответствии с Приказом МЗ РФ от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», возможно проводить:

1. либо моновакцинами (ЖПВ и против краснухи одновременно) с минимальным интервалом 1 месяц после применения противокоревой моновакцины,

2. либо комбинированной дивакциной (ЖПКВ против эпидемического паротита и кори) в сочетании с вакциной против краснухи с минимальным интервалом 3 месяца после применения противокоревой моновакцины,

3. либо комбинированной тривакциной (против эпидемического паротита, краснухи и кори) с минимальным интервалом 3 месяца после применения противокоревой моновакцины.

В 2 последних случаях, вакцинация против кори может быть засчитана в качестве плановой ревакцинации (V2). Подобная практика в настоящее время используется в рамках универсальной программы вакцинации против коревой инфекции в отдельных европейских странах (Германия, Франция, Люксембург, Лихтенштейн <https://vaccineschedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=8&SelectedCountryIdByDisease=-1>). В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по проведению подчищающей вакцинации против кори минимальный интервал между вакцинациями против кори обозначен 1 месяц (https://cdn.who.int/media/docs/defaultsource/immunization/immunization_schedules/table_3_feb_2023_english.pdf?sfvrsn=f549aec8_12&download=true).

В ситуации **ранее перенесенной вирусной инфекции кори или эпидемического паротита, или завершённой схемы вакцинации в отношении одного из данных вирусных антигенов у ребенка старше 6 лет**, при необходимости выполнения плановой вакцинации против других вирусных инфекций, **следует использовать моновакцины** против паротита и краснухи или моновакцины против кори и краснухи, соответственно. **В исключительных случаях ограниченного запаса моновакцинных препаратов**, возможно применение комбинированной тривакцины против кори, краснухи и паротита или дивакцины в сочетании с вакциной против краснухи

независимо от иммунного статуса вакцинируемого относительно вирусов кори, краснухи и паротита с минимальным интервалом 3 месяца после выздоровления от вирусной инфекции (кори, краснухи и паротита) или ранее проведенной двукратной иммунизации. В соответствии с Инструкцией по применению препарата, **это не является противопоказанием.** Учитывая эпидемиологическое неблагополучие по коревой, краснушной и паротитной инфекции в настоящее время, восприимчивые неиммунные лица имеют высокий риск стать причиной дальнейшего распространения инфекции, в связи с чем вакцинация не должна откладываться безосновательно.

С целью повышения эффективности мероприятий по борьбе с распространением кори, **следует пересмотреть категории детей и взрослых имеющих медицинские отводы**, с приведением в соответствие с нормативными документами (МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок»).

Приложение: таблица в формате excel.

Е.Г. Котова



Кусурбаева Ирина Иосифовна
8 (495) 627-24-00 (доб.1524)



Отчет по охвату вакцинами

	Число детей подлежащих вакцинации в рамках "подчищающей" вакцинации	Из них привито	Число детей подлежащих вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок	Из них привито
Корь				
Краснуха				
Эпидемический паротит				